Aussaat & Pflanzung im Februar

Aussaat & Pflanzung im

Nutzgarten

Aussaat & Pflanzung im

Ziergarten

Gemüse erfolgreich vorkeimen

Das 1x1 der richtigen Aussaat

Richtig aussäen bei Vorzucht oder Freilandaussaat

Tipps und Häufige Fehler - was bei einer erfolgreichen Aussaat von Gemüse und anderen Pflanzen zu beachten ist

Weiterlesen ..

Nutzgarten

Aussaaten von Gemüse und Kräutern im Februar

Im Februar wird es schon für viele Sorten Zeit, dass sie für die Vorzucht an einem warmen Platz vorgezogen werden, damit sie zum Auspflanzen im April oder Mai weit genug gediehen sind.

Welche Sorten von Gemüse Sie in diesem Monat schon alles vorziehen oder direkt aussäen können.

- Vorzucht (Erläuterungen)
  - Vorzucht
    Vortreiben von Gemüsepflanzen durch Aussaat im Frühbeetkasten, unter Glas oder auf der Fensterbank oder ggf. auch unter Folie.
    - Detailhinweise finden sich bei den einzelnen Gemüsesorten.
    - Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf das spätere Vereinzeln bzw. Verpflanzen.
    - Details zu Erntezeiten, Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen etc. können innerhalb einer Gemüseart sortenbedingt variieren.

- Freilandaussaat (Erläuterungen)

  - Freilandaussaat
    Aussaat von Gemüse direkt ins Beet / Direktsaat ins Freiland.

    - Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf Direktsaat oder ein späteres Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

    - Details zu Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen können sortenbedingt innerhalb einer Gemüseart variieren.

- **Artischocken**

  - Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März

  - Freilandaussaat: ab Mitte / Ende April

  - Abstand: 60 x 80 cm

  - Aussaattiefe: 1 cm

- Keimung: 10 - 20 Tage / bei 20 - 25 °C
- Ernte: ab Ende August 1. Jahr, sonst Juni/Juli

Aubergine

- Vorzucht: ab Anfang Januar - bis Ende März
- Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
- Abstand: 60 x 80 cm
- Aussaattiefe: 0,5 cm
- Keimung: 14 - 25 Tage / bei 22 - 25 °C
- Ernte: ab Ende Juli - bis Ende September

Baldrian

- Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang April
- Freilandaussaat: Mitte März bis Ende Mai
-

Abstand: 50 x 35 cm

- Aussaattiefe: 1 - 2 cm
- Keimung: 7 - 10 Tage / bei 19 - 21 °C
- Ernte: Blüten - Juli bis August / Wurzeln ab Oktober

- **Blumenkohl**
  - Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Ende März (unter Glas/Frühbeet)
  - Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Mitte Juni
  - Abstand: 50 x 40-50 cm, Herbstsorten 60 x 60 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
  - Keimung: 9 - 12 Tage / bei 14 - 15 °C
  - Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

- **Honigmelone**
  - Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April

- Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
- Abstand: 100 x 60 cm
- Aussaattiefe: 1 cm
- Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C
- Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

- **Knollensellerie**
  - Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende April
  - Abstand: 20 x 40 cm oder 30 x 30 cm
  - Aussaattiefe: Lichtkeimer nur andrücken
  - Keimung: 18 - 26 Tage / bei 19 - 22 °C
  - Ernte: ab Anfang September

- **Kohlrabi**
  -

Vorzucht: ab Ende Februar - bis Anfang Mai (Frühbeet)

- Freilandaussaat: ab Mitte Mai - bis Ende Juni
- Abstand: 25 x 25 cm bis 25 x 30 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

- **Melone**
  - Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April
  - Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
  - Abstand: 100 x 60 cm
  - Aussaattiefe: 1 cm
  - Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C
  - Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

- **Paprika**
  - Vorzucht: ab Mitte Januar - bis Ende April
  - Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
  - Abstand: 60 x 60 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 cm
  - Keimung: 11 - 14 Tage / bei 22 - 25 °C
  - Ernte: ab Mitte Juli - bis Ende Oktober
- **Peperoni**
  - Vorzucht: ab Mitte Januar - bis Ende April
  - Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
  - Abstand: 40 x 60 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 cm
  -

Keimung: 11 - 14 Tage / bei 22 - 25 °C

- Ernte: ab Mitte Juli - bis Ende Oktober

- **Porree**
  - Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende März (Frühbeet)
  - Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende Mai
  - Abstand: 15 x 30 cm bis 20 x 40 cm
  - Aussaattiefe: 2 - 3 cm
  - Keim-Vorbehandlung 7 Tage bei 5 - 10 °C (Kaltkeimer)
  - Keimung: 16 - 20 Tage / bei 14 - 20 °C
  - Ernte: ab Ende Juli - bis Ende Januar

- **Puffbohne**
  - Freilandaussaat: ab Mitte Februar - bis Ende April
  - Abstand: 40 x 35 cm

- Aussaattiefe: 3 - 4 cm
- Keimung: 5 - 10 Tage / bei 10 - 12 °C
- Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende August

- **Radieschen (unter Glas)**
  - Direktaussaat: ab Januar - bis April und August - bis Oktober
  - Abstand: 15 x 15 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
  - Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 - 19 °C
  - Ernte: ab Februar - bis Mai und ab September - bis November

- **Rettich**
  - Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August
  - Abstand: 25 x 20 cm
  -

Aussaattiefe: 1 cm

- Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

- **Spinat (Frühlings-Aussaat)**
  - Vorzucht: ab Februar - bis April unter Glas
  - Freilandaussaat: ab Mitte März - bis Ende April
  - Abstand: 20 x 7 cm
  - Aussaattiefe: 1 - 2 cm
  - Keim-Vorbehandlung günstig 7 Tage bei 5 - 10°C (Kaltkeimer)
  - Keimung: 9 - 12 Tage / bei 15 °C
  - Ernte: ab Anfang Mai - bis Mitte Juli

- Tomate
  - Vorzucht: ab Mitte Februar - bis Ende April

- Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
- Abstand: je nach Sortengröße 50 x 80 cm bis 90 x 100 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 23 °C
- Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

- **Wassermelone**
  - Vorzucht: ab Anfang Februar - bis Mitte April
  - Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
  - Abstand: 100 x 60 cm
  - Aussaattiefe: 1 cm
  - Keimung: 10 - 15 Tage / bei 20 - 26 °C
  - Ernte: ab Mitte August - bis Ende Oktober

Ziergarten

-

Bäume, Sträucher und Obst

Sobald das Wetter es zulässt und der Boden offen ist (aufgetaut), kann mit dem Pflanzen von Gehölzen, die nicht sonderlich frostempfindlich sind, begonnen werden.

Nutzen Sie jetzt die Zeit und warten Sie nicht erst, bis es anfängt grün zu werden! Denn später haben Sie noch genug anderes im Garten zu tun. Die Pflanzen haben es je später umso weniger leicht anzuwachsen, denn auch sie müssen sich im Frühling beeilen. Das können sie aber nicht, wenn sie relativ spät versetzt werden. Je mehr drückende oder sprießende Knospen und Grün an einer Pflanze ist, desto schlechter wird das Anwachsergebnis sein.

Das gilt natürlich vor allem für wurzelnackte Ware, aber auch Containerpflanzen sollte man nicht unbedingt erst setzen, wenn alles grün ist.